

تفضل بالدخول، هل
لديك سؤال؟

التحليل

التحليل أولاً، وثانيًا، وثالثًا

للأسف، نعم. يتطلب العلاج بمضادات التجلط دقة تامة. وهذا يعني إجراء تحليل النسبة المعيارية الدولية بصفة منتظمة. إذا كانت النسبة المعيارية الدولية لديك مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فإنك تواجه خطر حدوث نزيف أو جلطة دموية

نعم، حول تحليل النسبة المعيارية الدولية. كل شيء على ما يرام، ولكن هل يجب إجراؤه كثيرًا؟

ولكن لماذا يجب فحصها كثيرًا؟

لأننا نحتاج في بعض الأحيان إلى ضبط جرعة مضادات التجلط. فمثلًا، في البداية، قد تحتاج فقط إلى قرص واحد أو قرص ونصف القرص في اليوم. ولكن إذا بقيت النسبة المعيارية الدولية منخفضة، فقد تحتاج إلى زيادة الجرعة إلى قرصين يوميًا من حين لآخر. يمكن أن تؤثر الأدوية الأخرى أيضًا على النسبة المعيارية الدولية

ماذا لو لم أكن أتناول أي أدوية أخرى؟

فلا تزال بحاجة إلى التحليل بصفة منتظمة. يتيح لك ذلك أيضًا الفرصة لإبلاغنا عن أي تغييرات في حالتك، مثل عطلة قادمة، أو زيارة لطبيب الأسنان، أو إذا كنت تعاني الحمى. فنحن نريد معرفة كل شيء عنك. هذا يتيح لنا ضبط جرعتك عند الضرورة، لذا تحتاج إلى التحليل بصفة منتظمة

أتمنى أن أقول نعم. ولكن من الأهمية بمكان إجراء تحليل الدم وفقًا للجدول الزمني لتحديد عدد الأقراس التي تحتاج إليها، أي أسئلة أخرى؟

إدًا، لا توجد وسيلة لتجنب ذلك؟

كلا، هذا كل شيء. لقد انتهيت!