

Contactgegevens trombosedienst voor NPT medewerkers

Voor informatie, doorgeven van mededelingen, melden en vragen bij storingen

Tel: **070 - 210 7111** of **06 – 1307 5740** (8.00 - 12.30 & 14.00 - 16.30 uur)
E-mail: zelfmeet@labwest.nl
Fax: **070 – 210 7147**

Voor vragen over ingrepen

Tel: **070 – 372 0301** (13.30 – 16.30 uur)

Buiten kantooruren en op zaterdag, zondag en feestdagen

Voor spoedvragen buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen is een trombosedienststarts bereikbaar via telefoonnummer **071 – 526 4793**

Op onze website www.labwest.nl en in ons patiënten-informatieboekje kunt u nuttige informatie vinden

Doorgeven van bijzonderheden aan de trombosedienst

- Bij ernstig bloedverlies en grote of veel blauwe plekken bij de patiënt
- Als de patiënt ziek is (koorts hoger dan 38,0 °C, langdurig ernstige diarree, braken, bijkomende ziekte)
- Als de patiënt mag stoppen met antistollingsbehandeling. De trombosedienst moet een schriftelijke verklaring hebben van de arts
- Als de patiënt gaat starten of stoppen met medicijnen. Ook de start en stopdatum vermelden (raadpleeg ook de website van FNT www.fnt.nl)
- Als de patiënt LMWH-heparine spuitjes moet gaan gebruiken. De trombosedienst geeft aan wanneer er met de spuitjes gestopt mag worden (bij INR 2x binnen het streefgebied)
- Als de patiënt een operatie / ingreep moet ondergaan. Voor elke ingreep waarvoor het tijdelijk stoppen met de antistollingsmedicatie noodzakelijk is, moet de trombosedienst een schriftelijk bevestiging van de (behandelend)arts te ontvangen, **bij voorkeur minimaal 1 week van tevoren**. Het ingrepenformulier hiervoor is te vinden op onze website www.labwest.nl onder het item professionals, en kunt u vervolgens uitprinten. Laat dit formulier invullen door de behandelend arts en fax het formulier naar de trombosedienst
- Als de patiënt gaat verhuizen / opgenomen is / overleden is

Aandachtspunten

Wanneer mag er met heparine / LMWH spuiten gestopt worden?

- Bij patiënten die alleen heparine / LMWH spuiten gebruiken en geen andere bloedverdunner ligt de beslissing om te stoppen bij de behandelend arts
- Bij het gebruik van heparine / LMWH spuiten en het gelijktijdig starten met tabletten fenprocoumon of acenocoumarol, mag er pas gestopt worden met de spuiten wanneer:
 - De INR 2x achter elkaar in de streefwaarde zit of 2x minimaal boven de 2.0 is én mits er 5 dagen of langer heparine / LMWH is gebruikt. De trombosedienst geeft telefonisch en via vermelding op de doseerkalender door als er gestopt mag worden met de spuitjes.
 - Uitzonderingen / complicaties mag er eerder gestopt worden na overleg met behandelend arts / arts trombosedienst.

Dosering en doseringswijzigingen

Alle doseringen in Portavita / NPT module Trodis beginnen op dezelfde dag als waarop de INR is gemeten en doorgegeven. De dosering voor die dag kan gewijzigd zijn n.a.v. de hoogte van de INR uitslag. De doseerkalenders moeten diezelfde dag nog worden uitgeprint en verzameld in de medicatie mappen. Mocht de NPT-medewerker

's middags niet aanwezig zijn, dan dient hij / zij aan een collega te vragen om de doseerkalenders uit te printen.

De trombosedienst doet haar uiterste best om de doseringen zo spoedig mogelijk gereed te hebben. Wij verzoeken u om alle INR uitslagen voor 12.00 uur in Portavita / NPT module Trodis in te voeren. Het kan een enkele keer voorkomen dat de nieuwe dosering later komt dan 14.00 uur.

Er is een mogelijkheid voor elk NPT huis een inkijk / lees account te krijgen in Portavita / NPT module Trodis om zo de doseringen uit te kunnen laten printen door avondhoofden en / of teamleiders.

Ingrepen en ingrepenformulier

De medewerkers van het verpleeg / verzorgingshuis worden geacht alle ingrepen door te geven aan de trombosedienst. Hierbij is het belangrijk om ruim van te voren door te geven:

- Datum van de ingreep
- Soort ingreep
- In welk ziekenhuis / of praktijk
- En wie de behandelend specialist / tandarts is

De trombosedienst neemt contact op met de behandelend specialist om de gewenste INR / beleid na te vragen. De dosering wordt hierop vlak voor de ingreep aangepast en eventueel tijdelijk gestaakt, dit is te zien op de doseerkalender. Mocht er vitamine K nodig zijn om de INR te verlagen dan zal de medewerker van de trombosedienst telefonisch contact opnemen met de desbetreffende afdeling van het NPT huis.

Wanneer de INR test herhalen?

Bij twijfel van de meting of het testresultaat kan de test naar eigen inzicht herhaald worden. Bij INR 8.0 of > 8.0 dient meteen tweede meting gedaan te worden. Noteer bij invoer van INR 8.0 of de INR exact 8.0 is of dat deze groter is dan 8.0.

Vergeeten in te nemen / geven van de antistollingsmedicatie

- **Bij het opmerken vóór 12.00 uur:**
 - 's avonds zo laat mogelijk de dosering die op de kalender staat
 - meldt dit bij de trombosedienst
- **Bij het opmerken na 12.00 uur:**
 - de dosering innemen wat op de doseerkalender staat
 - meldt dit bij de trombosedienst

Patiënten die dezelfde week nog een ingreep ondergaan; neem contact op met de trombosedienst voor advies.

Strips en prikkers bestellen

Minimaal 1 week van te voren de strips en prikkers bestellen via zelfmeet@labwest.nl

Inloggen lukt niet in Portavita

Mocht het niet lukken om in te loggen of bent u uw wachtwoord vergeten, neem telefonisch contact op met de trombosedienst en stuur een e-mail naar zelfmeet@labwest.nl of npt@labwest.nl met je naam en geboortedatum en voor welke organisatie je werkt.

Voor het wijzigen van uw eigen e-mailadres, neem dan contact op met de beheerder van de website van Portavita / NPT module Trodis.