

CHECK

CHECK, CHECK, DUBBEL CHECK.

Komt u binnen. U wilt iets vragen?

Ja, over die INR-controle. Alles prima hoor, maar kan dat niet wat minder?

Helaas niet. Uw antistollingsbehandeling moet heel nauwkeurig gebeuren. Regelmatige controle van de INR hoort daarbij. Als de INR te hoog of te laag is loopt u kans op een bloeding of een bloedpropje.

Maar waarom zo vaak controleren?

Omdat we uw dosis antistollingsmiddel soms moeten aanpassen. Eerst hebt u bijvoorbeeld aan 1 of 1,5 tablet per dag genoeg. Maar als de INR te laag blijft kan het zijn dat u af en toe 2 tabletten op een dag moet innemen. Ook kunnen sommige andere medicijnen de INR beïnvloeden.



En als ik nou geen andere medicijnen gebruik?

Dan nog moeten we regelmatig controleren. Ook om van u te horen of er bijzonderheden zijn. Of u op vakantie gaat bijvoorbeeld. Of naar de tandarts moet. Of dat u koorts hebt gehad. We willen graag overal van op de hoogte zijn. Dan kunnen we uw dosering aanpassen als het nodig is. Vandaar die regelmatige controle.



Ik kom er dus niet onderuit?



Ik zou willen dat het anders was. Maar het is echt nodig om volgens afspraak uw bloed te laten controleren om het aantal in te nemen tabletten te bepalen. Is er nog iets dat u wilt vragen?



Nee hoor. Ik weet genoeg. Alles onder controle!