

Testler

TEST BİR, İKİ, ÜÇ

Lütfen girin. Bir sorunuz mu vardı?

Evet, INR testi hakkında bir sorum var. Her şey tamam da bunun çok sık bir şekilde mi yapılması gerekiyor?

Ne yazık ki evet. Antikoagülasyon tedaviniz aşırı düzeyde doğruluk gerektiriyor. Bu da INR'nizin düzenli olarak test edilmesi demek. INR'niz fazla yüksek veya fazla düşük olursa, kanama ve kan pıhtısı oluşumu riski ile karşı karşıya kalırsınız.

Peki bu değerlerin neden bu kadar sık kontrol edilmesi gerekiyor?

Bunun nedeni, zaman zaman aldığınız antikoagülan dozunu ayarlamamızın gerekmesi. Örneğin; başlangıçta 1 veya 1½ hap almanız gerekebilir. Ancak INR değerlerinizin düşük kalması halinde, zaman zaman günde 2 hap almanız gerekebilir. Diğer ilaçlar da INR değerlerinizi etkileyebilir.

Peki ya başka bir ilaç almazsam?

Yine de düzenli olarak test yaptırmanız gerekiyor. Bu, ayrıca bize durumunuzdaki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı sunuyor. Gelecek bir tatil. Veya dış hekimi ziyareti gibi. Ya da ateşinizin çıkıp çıkmadığı. Hakkınızdaki her şeyi bilmek istiyoruz. Bu şekilde, gerektiğinde aldığınız dozu değiştirebiliyoruz. Bu nedenle düzenli olarak testlerden geçmeniz gerekiyor.

Bunun başka bir yolu var mı?

Bu soruya evet cevabını vermek isterdim. Ancak almanız gereken hap sayısının belirlenmesi için kanınızda programa uygun şekilde kontroller gerçekleştirilmesi gerçekten önemli. Başka sorunuz var mı?

Hayır. Bu kadar. Tamamdır!